

GROUPE LABEXA



BIOLOGIE MEDICALE

LES TESTS DE LABORATOIRE PEUVENT AIDER À DÉPISTER

# CHLAMYDIA TRACHOMATIS



AFFAIRES MÉDICALES





## CHLAMYDIA TRACHOMATIS : C'EST QUOI ?

**Chlamydia trachomatis** est une bactérie responsable de la chlamydie, une des **infections sexuellement transmissibles (IST)** les plus répandues en France, notamment chez la femme jeune (15-25 ans).



## COMMENT SE TRANSMET CHLAMYDIA TRACHOMATIS ?

**LORS DE RAPPORTS SEXUELS NON PROTÉGÉS AVEC UN(E) PARTENAIRE CONTAMINÉ(E): contact vaginal, anal ou oral**



**LORS DU PARTAGE  
D'OBJETS  
CONTAMINÉS :**

Utilisation  
de sex-toys



**TRANSMISSION POSSIBLE PAR LA MÈRE AU FOETUS  
PENDANT LA GROSSESSE OU AU NOUVEAU-NÉ LORS D'UN  
ACCOUCHEMENT PAR VOIE BASSE**



## QUELQUES CHIFFRES



**70%**

des  
infections  
sans  
symptômes  
chez la  
femme



**1<sup>ère</sup>**

cause  
d'infertilité  
dans les  
pays  
industrialisés



**1<sup>ère</sup>**

cause d'IST  
d'origine  
bactérienne



**X3**

du nombre de  
chlamydioses  
en 4 ans  
(2012-2016)

(Source : Santé Publique France)



## QUELS SONT LES SIGNES ?

Le plus souvent, il n'y a aucun signe d'infection. On peut donc, être porteur de la bactérie, sans le savoir et contaminer sa ou son partenaire.

### LES SIGNES D'INFECTIONS :



**Pertes vaginales**



**Brûlures en urinant**



**Écoulement au niveau de de la verge**



**Brûlures en urinant**

Non traitée, les conséquences à long terme peuvent être graves, en particulier chez la femme : infection des trompes, stérilité, grossesse extra utérine...



## POURQUOI SE FAIRE DÉPISTER ?



Réduire le risque de complications à long terme chez la femme.



Limiter la propagation de l'infection dans la population, grâce à un traitement précoce.



## QUAND SE FAIRE DÉPISTER ?

Les jeunes femmes (15-25 ans), sexuellement actives, doivent être dépistées au moins une fois par an de manière systématique.

Mais d'autres situations peuvent nécessiter un dépistage :



**Rapports sexuels non protégés avec un nouveau partenaire**



**Grossesse ou désir de maternité**



**Rupture de préservatif**



**Demande de votre médecin ou de votre sage-femme**



**Au moins 2 partenaires dans l'année**



**Arrêt du préservatif dans votre couple**



**Partenaire diagnostiqué positif**



**À votre demande**



## COMMENT SE FAIRE DÉPISTER ?

### CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU VOTRE SAGE-FEMME

Il pourra vous prescrire une recherche de Chlamydia trachomatis par prélèvement, ainsi qu'une prise de sang afin de rechercher d'autres IST (VIH, hépatites B et C, syphilis).



### SANS PRESCRIPTION MÉDICALE.

Rendez-vous dans votre laboratoire du groupe LABEXA le plus proche et demandez conseil à votre biologiste médical LABEXA (spécialiste en médecine de laboratoire).



## QUEL PRÉLÈVEMENT RÉALISER ?



Recueil d'urines



Auto prélèvement vaginal (recueil à effectuer soi-même à l'aide d'un écouvillon)



## QUE FAIRE SI MON RÉSULTAT EST POSITIF ?



### CONSULTER UN MÉDECIN

Il vous prescrira un traitement (antibiotiques) permettant l'éradication de la bactérie.



### AVERTIR SON (SES) PARTENAIRE(S)

Pour qu'il(s) réalise(nt) aussi le dépistage.



### S'ASSURER DE L'EFFICACITÉ DU TRAITEMENT

Faire un nouveau prélèvement 3 mois après la fin du traitement.



### SE FAIRE DÉPISTER POUR LES AUTRES IST

Effectuer les sérologies VIH, hépatites B et C, syphilis...



## QUELLES SONT LES MESURES DE PRÉVENTION ?

Il n'existe pas de vaccin efficace

Une infection traitée et guérie n'empêche pas d'être contaminé une nouvelle fois.

**Les bons réflexes pour se protéger de la chlamydie sont les mêmes que ceux à utiliser pour lutter contre les autres IST\*.**



### PRÉSERVATIF

Pour se protéger et protéger les autres



### DÉPISTAGE

Pour savoir si on est infecté



### TRAITEMENT

Pour se soigner et éviter de contaminer son ou sa partenaire

\* Infections Sexuellement Transmissibles



Bassens	Bordeaux Pey-Berland	Gujan-Mestras	Mont-de-Marsan
Bègles	Bordeaux Saint-Augustin	Langoiran	Pancaut
Béguey-Cadillac	Bordeaux Victoire	Langon	Mont-de-Marsan Quirinal
Biganos	Bruges Charles-de-Gaulle	La Réole	Pessac Alouette
Biscarosse	Bruges Jean Villar	Le Bouscat Centre	Pessac Monteil
Blaye	Carbon-Blanc	Le Bouscat Libération	Portets
Bordeaux Bastide	Caudéran Leclerc	Mérignac Centre	Saint-Andre-de-Cubzac
Bordeaux Chartrons	Caudéran Pasteur	Mérignac Marbotin	Saint-Jean-d'Ilac
Bordeaux Gambetta	Caudéran Tassigny	Mérignac Mondésir	Saint-Pierre-du-Mont
Bordeaux Mandron-Tivoli	Cavignac	Montendre	Villeneuve d'Ornon Chambéry
Bordeaux Nord Ravezies	Cestas	Mont-de-Marsan Foch	Villeneuve d'Ornon Les Graves
	Gradignan		



Agen Europe	Eauze	Marmande	Mirande
Agen Jayan	Casteljaloux	Route de Bordeaux	Nérac
Agen Lacour	Condom	Marmande Centre	Tonneins
Aiguillon	Lectoure		Vic-Fezensac
Miramont de Guyenne	Maubourquet		



Anglet Bernain	Bayonne Place des Basques	Jurançon	Saint-Jean-de-Luz Elgar
Anglet Les Cinq Cantons	Biarritz Aguilera	Nay	Tarnos
Anglet Mairie	Biarritz Beurivage	Pau Lyautey	
Aressy	Biarritz La Marne	Pau Avenue du Loup	
Bayonne Hauts de Sainte-Croix	Hendaye	Saint-Jean-de-Luz centre	

**Pour toute information complémentaire merci de vous rendre sur notre site internet : [www.labexa.fr](http://www.labexa.fr)**

Document réalisé par le département des Affaires Médicales du groupe LABEXA

© Groupe LABEXA – Septembre 2019

Tous droits réservés – Reproduction totale ou partielle strictement interdite sans autorisation.

AFFAIRES MÉDICALES

